

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR.
Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi
Farmakoloji və Farmakopeya
Ekspert Şurasının sədri

E.M. Ağayev

“ 23 noyabr ” 2020-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

Bu dərmanı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl bu içlik vərəqəsini diqqətlə oxuyun, çünki burada Sizin üçün mühüm məlumatlar vardır.

- *Bu içlik vərəqəsini atmayın. Daha sonra onu təkrar oxumağınız lazım gələ bilər.*
- *Əgər əlavə suallarınız olarsa, lütfən, həkiminizə və ya əczaçıya müraciət edin.*
- *Bu dərman şəxsən Sizin üçün təyin edilmişdir, onu başqalarına verməyin.*
- *Bu dərmandan istifadə müddətində həkimə və ya xəstəxanaya getsəniz, həkiminizə bu dərmandan istifadə etdiyiniz barədə məlumat verin.*
- *Bu içlik vərəqədə yazılanlara dəqiq əməl edin. Dərmanın Sizin üçün tövsiyə olunan dozasından yüksək və ya aşağı doza istifadə etməyin.*

GENKORT 10 mq tabletlər
GENKORT

Tərkibi

Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 10 mq hidrokortizon vardır

Köməkçi maddələr: laktoza monohidrat, mikrokristallik sellüloza PH (102), natrium nişastaqlikolyatı, povidon (K-25), polisorbət 80, maqnezium stearat, eritrozun lakı.

Təsviri

Cəhrayı rəngli, bir tərəfində bölmə xətti olan, digər tərəfi düz, ikitərəfli qabarıq, peroral (daxilə) istifadə edilən örtüksüz tabletlərdir.

Farmakoterapevtik qrupu

Sistem istifadə üçün kortikosteroidlər. qlükokortikoidlər. Hidrokortizon.

ATC kodu: H02AB09.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

GENKORT-un tərkibində 10 mq hidrokortizon vardır. Hidrokortizon hormonu orqanizmdə böyrəküstü vəzilər tərəfindən hasil olunan təbii və steroid hormonlardan biridir. Hidrokortizon hormonu qlükokortikoidlər (steroid) kimi tanınır. GENKORT, orqanizmdə təbii olaraq əmələ gələn hidrokortizon hormonunun sintetik versiyasıdır.

İstifadəsinə göstərişlər

Hidrokortizon orqanizmdə bir çox funksiyanı tənzimləmək və aşağıdakı xəstəlikləri müalicə etmək üçün istifadə olunur:

- böyrəküstü vəzilərin qeyri-qənaətbəxş fəaliyyət göstərməsi nəticəsində orqanizmdə hidrokortizon hormonunun çatışmazlığı (adrenokortikal çatışmazlıq) hallarında birinci xətt müalicəsi kimi və ya mineralokortikoid qrupu dərmanları ilə kombinə olunmuş müalicə kimi;

- böyrəküstü vəzilərin anadangəlmə həddindən artıq inkişaf edərək böyüməsi (böyrəküstü vəzilərin anadangəlmə hiperplaziyası),
- orqanizmdə qalxanabənzer vəzinin qeyri-irinli iltihabı,
- xərçənglə bərabər meydana çıxan hiperkalsiemiya,
- qısa müddətli istifadə zamanı kəskinləşən və progressivləşən aşağıdakı revmatik xəstəliklərin əlavə müalicəsi üçün: oynaqların psoriaz xəstəliyi ilə birlikdə meydana çıxan iltihabı, oynaqlarda ağrı və deformasiya şəklində meydana çıxan davamlı bir xəstəlik (revmatoid artrit), bel fəqərələrində rigidliklə müşayiət olunan ağrılı, progressivləşən revmatizm xəstəliyi (ankilozlaşdırıcı spondilit), oynaqtrafi kisələrin kəskin iltihabı, kəskin qeyri-spesifik tenosinovit, kəskin podaqrik artrit, kirəclənmə ilə birlikdə oynaq mayesinin iltihabları (sinovit), oynaq üzərindəki strukturların iltihabı (epikondilit),
- dəridə soyulma (qabıqlanma) ilə meydana çıxan bir xəstəlik (sistem qırmızı qurdeşənəyi),
- dərinin və əzələnin ödem və əzələ zəifliyi ilə özünü göstərən iltihabı (sistem dermatomiozit),
- Revmatizm (kəskin revmatoid kardit) nəticəsində ürəkdə inkişaf edən iltihablar,
- Dəridə inkişaf edən aşağıdakı iltihabi xəstəliklərin müalicəsində: dərinin iltihabi xəstəliyi (pemfiqus), dərinin qlütənə həssaslıqla birlikdə müşahidə edilən, maye dolu qabarlarla meydana çıxan iltihabi xəstəliyi (herpes formalı bullyoz dermatit), dəridə və göz ətrafında qançır, ödem və qızartı ilə müşayiət olunan iltihabi xəstəlik (Stivens-Conson sindromu), dəridə qabıqlanma ilə meydana çıxan iltihabi vəziyyətlər (eksfoliativ dermatit), üzdə, əllərdə və bədəndə dərinin limfoması (*mikoz fungoides*), ağır psoriaz, bədənin tüklü nahiyələrində ağır iltihablar ağır dərəcəli (seboreyalı dermatit),
- müvafiq standart müalicəyə cavab verməyən ağır allergik xəstəliklərin, möcumi və ya xroniki allergik rinitin, zərdab xəstəliyinin, ağciyərlərdə bronxial astmanın, kontakt dermatitin, atopik dermatitin, dərmana qarşı inkişaf edən yüksək həssaslıq hallarının müalicəsi;
- gözdə və ya gözün hissələrində inkişaf edən ağır allergik və iltihabi vəziyyətlərin müalicəsində: gözün allergik iltihabı (allergik konyunktivit), gözün buynuz qişasının iltihabı (keratit), gözün şəffaf cismində inkişaf edən allergik yaralar (buynuz qişanın allergik xoraları), gözün virusla bağlı iltihabı (*herpes zoster oftalmicus*), irit və iridosiklit, xorioretinit, gözün ön hissəsində iltihablar, diffuz arxa uveit və xorioidit, optik nevrin,
- ağciyərin və ya tənəffüs yollarının müxtəlif ağır və progressivləşmiş xəstəliklərinin müalicəsində: ağciyərdə düyünlərlə və zədələrlə inkişaf edən ağciyər xəstəliyi (simptomatik sarkoidoz), digər üsullarla müalicə edilməyən ağciyər xəstəliyi (Löffler sindromu), ağciyərlərin sürətlə iltihablaşmış və kəskinləşmiş və ya geniş yayılmış vərəmi (müvafiq terapiya ilə), ağciyərin mədə möhtəviyyatının tənəffüs yollarına çıxması nəticəsində yaranan iltihabı (aspirasion pnevmonit),
- qızdırma, iynə ucu şəklində qırmızı qançırılar, şüurun qarışması, baş ağrısı və trombositlərin sayının azalması (idiopatik trombositopenik purpura) ilə meydana çıxan xəstəlik, ikinci inkişaf edən trombosit-qan lövhəcikləri sayında azalma, qazanılmış autoimmun hemolitik anemiya, eritroblast adlı qan hüceyrələrinin azalması, anadangəlmə anemiya (anadangəlmə hipoplastik anemiya),
- böyüklərdə leykemiya və limfoma və limfa düyünlərinin xərçəngi,
- uşaqlıq dövründə kəskin leykoz,
- sistem qırmızı qurdeşənəyi nəticəsində yaranan böyrək xəstəliyi ilə bağlı sidikdə zülal aşkar edilməsi və ya sidik ifrazının stimullaşdırılması,
- yoğun bağırsaqda iltihabi yaralar, regional bağırsaq iltihabı (xoralı kolit və regional enterit (Kron xəstəliyi));
- Beynin selikli qişasının vərəm mənşəli iltihabı (vərəmli meningit) zamanı uyğun vərəməleyhinə müalicə ilə yanaşı, parazitlərin törətdiyi ağır və ölümcül xəstəliklərin (nevroloji və ya miokard zədələnməsilə trixinellyoz) müalicəsində istifadə olunur.

Əks göstərişlər

Aşağıdakı hallarda GENKORT-un istifadəsi əks göstərişdir.

Əgər,

- Hidrokortizona və ya GENKORT-un tərkibində olan köməkçi maddələrdən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslığınız varsa,
- orqanizminizdə sistem (daxili orqanlar daxil olmaqla) göbələk xəstəliyiniz varsa,
- Sizə canlı və ya zəiflədilmiş canlı vaksin istifadə edilmişdirsə, GENKORT istifadə etməyin.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Əgər,

- Kortikosteroid terapiyası alan xəstələr qeyri-adi stresə məruz qaldıqda (məsələn, cərrahi əməliyyat, travma və s.), sürətli təsir göstərən kortikosteroidlərin dozası artırılmalıdır.
- Hidrokortizon orqanizmdə bəzi infeksiya və febril (qızdırmalı) xəstəlik əlamətlərini maskalaya bilər, istifadə zamanı infeksiyalar inkişaf edə bilər və müalicə zamanı bakteriya, göbələk və ya parazit mənşəli bu iltihabi hallar arta bilər. Bu infeksiyalar bəzən yüngül, bəzən ölümcül ola bilər. Doza artdıqca infeksiyalar daha da ağırlaşa bilər.
- Uzunmüddətli istifadə zamanı gözdə pərdəmələ gəlməsi (katarakt), gözdaxili təzyiqin artması (qlaukoma), göz sinirlərinin zədələnməsi baş verə, gözlərdə infeksiyalar inkişaf edə bilər.
- Yüksək dozada qan təzyiqinin yüksəlməsi (hipertenziya), orqanizmdə su və duzun ləngiməsi (saxlanması), ödem, kaliumun orqanizmdən xaric olmasının artması müşahidə edilə bilər. Belə hallarda, əlavə kalium müalicəsi aparılmalı və duz məhdudlaşdırılmalıdır. Bütün kortikosteroidlər orqanizmdən kalsiumun xaric olmasını artırır.
- Hidrokortizonu immun sistemi tormozlayan dozalarda qəbul edərkən öldürülmüş və ya zəiflədilmiş peyvəndlər (vaksinlər) istifadə oluna bilər, ancaq tətbiq olunan peyvəndin təsiri azalacaq.
- Yayılmış (diffuz) və aktiv vərəm zamanı digər vərəm dərmanları ilə birlikdə istifadə edilməlidir. Tükənmiş və ya gecikmiş mərhələdə vərəm zamanı xəstəliyin reaktivləşə biləcəyi üçün daha diqqətli müşahidə zəruridir. Hidrokortizonun uzunmüddətli istifadəsi zamanı bu xəstələr vərəmə qarşı profilaktik müalicə almalıdırlar.
- Hidrokortizon immun sistemi tormozlayacağından, müalicə alan xəstələr suçiçəyi və qızılca kimi xəstəliklərin inkişafına daha çox meyilli olacaqlar. Uşaq və yetkin xəstələrdə diqqətli olmaq lazımdır, belə ki, bu xəstəliklər bəzən çox ağır və ya ölümcül ola bilər. Hidrokortizonun hansı dozada, hansı yolla və müddətdə istifadəsinin bu xəstəliklərə səbəb ola biləcəyi və xəstələrdə əvvəllər keçirilmiş xəstəliklərin bu infeksiya riskini artırıb-artırmayacağı məlum deyil. Əgər suçiçəyi inkişaf edərsə, suçiçəyiəleyhinə immunoqlobulin (VZIG), qızılca inkişaf edərsə, əzələ daxilinə inyeksiya yolu ilə immunoqlobulin (IG) dərmanı yeridilməlidir.
- *Strongyloides* bağırsağ qurdlarının səbəb olduğu xəstəlikləri olan insanlara hidrokortizon ehtiyatla təyin edilməlidir. Hidrokortizon bu cür xəstələrdə immun sistemi tormozlayacağından, infeksiyanın artmasına, ağır və ölümcül bağırsağ iltihabına və ya qanın zəhərlənməsinə səbəb ola bilər.
- Preparatın istifadəsi nəticəsində inkişaf edən adrenal (böyrəküstü vəzi) çatışmazlıq hidrokortizonun dozasının azaldılması ilə azalacaq. Bu çatışmazlıq müalicənin dayandırılmasından sonra davam edə bilər. Bu halda, əgər stres inkişaf edərsə, hormonal terapiya yenidən nəzərdən keçirilməlidir.
- Hipotireozu və qaraciyərin sirrozu olan pasiyentlərdə kortikosteroidlərin güclənmiş təsiri qeyd edilmişdir.
- Gözdə herpes simplex virus infeksiyası olan xəstələrin müalicəsi üçün istifadə ediləcəksə, ehtiyatla istifadə edilməlidir, çünki gözün buynuz qişasında deşilmələr ola bilər.
- Hidrokortizonla müalicə qəflətən yox, tədricən dozaları azaltmaqla dayandırılmalıdır.
- Hidrokortizonun istifadəsi ilə; həddindən artıq həyəcan, yuxusuzluq, əhval dəyişikliyi, şəxsiyyət pozğunluğu, ağır depressiya kimi psixi pozğunluqların inkişaf edə biləcəyi və ya müalicə zamanı kəskinləşə biləcəyi barədə məlumat verilmişdir.
- Hidrokortizon bağırsağın iltihabı, bağırsağın perforasiyası, bağırsağ infeksiyaları, yeni bağırsağ əməliyyatları, mədə xorası, böyrək çatışmazlığı, yüksək qan təzyiqi (hipertoniya), sümük kütləsinin itkisi, əzələ kütləsinin itkisi və əzələ xəstəliklərində ehtiyatla istifadə edilə bilər.

- Hidrokortizon istifadə edən uşaqların inkişafı diqqətlə izlənilməlidir.
 - Hidrokortizonlamüalicə alan insanlarda bədxassəli şişin inkişafı (Kapoşi sarkoması) qeyd edilmiş, lakin müalicənin dayandırılması ilə xəstəliyin gerilməsi barədə məlumat verilmişdir..
 - Sistem kortikosteroid qəbul etdikdən sonra ölümcül ola biləcək feoxromositoma krizi haqqında məlumat mövcuddur.
 - Hidrokortizonun istifadəsi ilə bağlı əlavə təsirlər dozadan və müalicənin müddətindən asılı olduğundan, hər bir xəstə üçün fərdi olaraq risk / fayda nisbəti qiymətləndirilməli və müalicə lazım gələrsə, o, hər gün və ya fasilələrlə aparılmalıdır.
- Bu xəbərdarlıqlar, keçmişdə hər hansı dönmədə olmuş olsa belə, Sizin üçün keçərlidirsə, *GENKORT-un tərkibində olan bəzi köməkçi maddələr barədə mühüm məlumatlar* GENKORT-un tərkibində laktoza vardır. Əgər Sizde qalaktozaya qarşı dözümsüzlük, laktaza çatışmazlığı və ya qlükoza-qalaktoza malabsorbsiyası kimi nadir irsi xəstəliklər varsa, bu preparatdan istifadə etməməlisiniz.
- GENKORT-un hər tabletinin tərkibində 16 mq natrium nişasta qlikolyatı vardır. Nəzarət olunan natrium pəhrizi saxlayan xəstələr üçün bunu nəzərə almaq lazımdır. Lütfən bunu həkiminizə bildirin.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

GENKORT ilə eyni zamanda aşağıdakı dərmanlardan hər hansı birini istifadə edirsinizsə, bu barədə həkiminizə məlumat verin:

- Qaraciyər fermentlərinə təsir göstərən fenobarbital, fenitoin və rifampisin adlı dərmanlar.
- Troleandomisin və ketokonazol adlı göbələk xəstəliyini müalicə etmək üçün istifadə olunan dərmanlar.
- Qanın laxtalanmasını təmin edən dərmanlar.
- Antikoagulyantlar (qanı durulaşdıran dərmanlar).
- Aspirin və digər qeyri-steroid iltihabəleyhinə dərmanlar (yüngüldən orta dərəcəyə qədər ağrıları müalicə etmək üçün istifadə olunan dərmanlar).

Əgər hazırda resept əsasında və ya reseptsiz buraxılmasından asılı olmayaraq hər hansı digər dərman preparatı istifadə edirsinizsə və ya yaxın zamanlarda istifadə etmişinizsə, bu barədə həkiminizə və ya əczaçıya məlumat verin.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Dərmanı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl həkiminizlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Əgər hamiləsinizsə və ya uşaq əmizdirirsinizsə, bu barədə həkiminizə məlumat verin. Həkiminiz hamiləlik və laktasiya dövründə GENKORT istifadə edib-etməməyinizə qərar verəcəkdir. GENKORT, zərurət olmadıqca hamiləlik dövründə istifadə edilməməlidir. GENKORT körpəyə təsir edir və inkişafını ləngidir.

Müalicə müddətində hamilə qaldığınızı hiss etsəniz, dərhal həkiminizlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Laktasiya

Dərmanı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl həkiminizlə və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Əgər uşaq əmizdirir və eyni zamanda GENKORT istifadə edirsinizsə, dərman ana südünə keçə bilər. Laktasiya dövründə (uşağın ana südü ilə qidalandırıldığı dövrdə) aşkar zərurət olmazsa, GENKORT istifadə edilməməlidir.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

GENKORT vertiqo (başgicəllənmə hissi), görmədə pozğunluğa və / və ya əzələ zəifliyinə səbəb ola bilər. Bu hallar baş verərsə, nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarə etməyin.

İstifadə qaydası və dozası

Böyükələr

Həkiminiz tərəfindən başqa bir tövsiyə edilmədiyi halda, müalicə ediləcək xəstəlikdən asılı olaraq hidrokortizonun başlanğıc dozası gündə 20-240 mq arasında olmalıdır. Doza xəstənin müalicəyə verdiyi cavaba görə təyin olunmalıdır.

Həkiminiz xəstəliyinizdən asılı olaraq dərmanınızın dozasını təyin edəcək və sizə tətbiq edəcəkdir.

Istifadə yolu və qaydası

Tabletləri yeməklə və ya yemək arası daxilə qəbul edilə bilər. Yaxşı olar ki, günün eyni vaxtında qəbul edilsin.

Müxtəlif yaş qrupları

Uşaqlarda istifadəsi

Həkiminiz uşaqlar üçün effektiv ola biləcək aşağı dozaları təyin edəcək və uşaqların böyüməsini və inkişafını izləyəcəkdir.

Yaşlılarda istifadəsi

Dərmanı istifadə edərkən həkiminiz sizi mütəmadi olaraq yoxlayacaq və xəstəliyinizə görə sizin üçün uyğun doza təyin edəcəkdir.

Xüsusi hallarda istifadəsi

Böyrək/Qaraciyər çatışmazlığı

Əgər böyrək və ya qaraciyər çatışmazlığınız varsa, xəstəliyinizdən asılı olaraq həkiminiz dərmanınızın dozasını təyin edəcək və sizə tətbiq edəcəkdir.

GENKORT-un qida və içkilərlə istifadəsi

GENKORT yeməklə və yemək arası istifadə edilə bilər.

GENKORT ilə müalicənin dayandırılması zamanı meydana çıxma biləcək təsirlər

GENKORT tabletlərinin qəbulunu kəskin şəkildə dayandırmayın. Həkiminiz dozanızı tədricən azaldacaqdır. GENKORT-un qəbulunu qəflətən dayandırmayın (məsələn, qan təzyiqinizi həddindən artıq aşağı sala biləcək xəstəliklərdən sonra). Dərmanın istifadəsinin dayandırılması ilə ümumi narahatlıq, qızdırma, əzələlərdə və ya oynaqalarda ağrı kimi simptomlar meydana çıxma bilər. Həkiminiz və ya əczaçı tabletlərin sayını necə azaltmaq lazım olduğunu Sizə söyləyəcək.

GENKORT-u istifadə etməyi unutmusunuzsa

Unudulmuş dozanı əvəz etmək üçün ikiqat doza istifadə etməyin.

Gözləyin və növbəti dozanı adi vaxtında qəbul edin. Unudulmuş dozanı əvəz etmək üçün ikiqat doza qəbul etməyin. Dərhal həkiminizə və ya əczaçıya məlumat verin.

Əgər GENKORT-un təsirinin çox güclü və ya zəif olduğunu müşahidə edirsinizsə, bunu həkiminizə və ya əczaçıya bildirin.

Əlavə təsirləri

Bütün dərmanlar kimi GENKORT-un tərkibində olan maddələrdən hər hansı birinə qarşı həssas olan insanlarda əlavə təsirlər meydana çıxma bilər. Lakin hər xəstədə əlavə təsirlər müşahidə edilməyə bilər.

Əgər aşağıdakı hallardan hər hansı biri baş verərsə, GENKORT-u istifadə etməyi dayandırın və bu barədə həkiminizə məlumat verin və ya ən yaxın xəstəxananın təcili yardım şöbəsinə müraciət edin.

- Perforasiya və ya qanaxma ilə mədə-bağırsaq xoraları, qarın ağrısı (xüsusən də belinizə yayılırsa), anusdan qan gəlməsi, qara və ya qanlı nəcis və / və ya qan qusma.
- Mədəaltı vəzinin iltihabı, qusma ilə müşayiət olunan elə yayılan qarın ağrısı, şok və huşun itməsi kimi əlamətlər.
- Nəfəs alma çətinliyi, traxeya və ya boğazda tutulma hissi, dəridə geniş yayılmış qızartı ilə xarakterizə olunan allergik reaksiyalar.

Bunların hamısı çox ciddi əlavə təsirlərdir.

Əgər bunlardan biri Sizde meydana çıxarsa, deməli, GENKORT-a qarşı yüksək həssaslığınız var.

Təcili tibbi müdaxiləyə və ya xəstəxanaya yerləşdirilməyə ehtiyacınız ola bilər.

Əlavə təsirlər başvermə tezliyinə görə aşağıdakı kimi təsnif olunur.

Çox tez-tez: 10 xəstənin ən azı 1-ində meydana çıxma bilər.

Tez-tez: 10 xəstənin birindən azında, lakin 100 xəstənin birindən çoxundameydanaçıxma bilər.

Bəzən: 100 xəstənin birindən azında, lakin 1000 xəstənin birindən fazla meydana çıxa bilər.

Nadir: 1 000 xəstənin birindən azında meydana çıxa bilər.

Çox nadir: 10 000 xəstənin birindən azında meydana çıxa bilər.

Məlum deyil: mövcud məlumatlar əsasında başvermə tezliyini müəyyən etmək mümkün deyil.

Tez-tez

- Qarında köp
- Xorali ezofaqit
- Yaranın sağalmasında gecikmə
- Sümüklərdə ərimə (sümük kütləsinin itməsi).

Məlum deyil

- Kuşinq sindromu adlanan xəstəliyin əlamətlərinə bənzər simptomlar
- Uşaqların inkişafında azalma
- Stress, travma, cərrahi əməliyyat və ya xəstəlik nəticəsində böyrəküstü vəzilərin və hipofiz vəzinin çatışmazlığı
- Qeyri-müntəzəm menstrual qanaxmalar
- Diabetin baş verməsi
- İnsulina və şəkərli diabetin müalicəsi üçün istifadə olunan digər dərmanlara tələbatın artması
- Tər ifrazının artması
- Karbohidratlara qarşı dözümlülüyün (tolerantlığın) azalması
- Orqanizmdə zülalın parçalanması nəticəsində mənfi azot balans
- Gözün arxa tərəfində inkişaf edən subkapsulyar katarakta
- Mərkəzi seroz xorioretinopatiya
- Gözdaxili təzyiqin artması
- Göz almasının qabağa doğru böyüməsi

Qlaukoma

- Göz diskində ödem ilə təzahür edən kəllədaxili təzyiqin artması
- Qıcolma tutmaları
- Başgicəllənmə
- Baş ağrısı
- Epidural lipomatoz
- Həssas xəstələrdə ürək çatışmazlığı
- Qan təzyiqinin yüksəlməsi
- Dəridə incəlmə və qırılmalar
- Dəridə nöqtəvi qanaxmalar
- Dəridə zədələnmələr
- Göyərmə (qançır)
- Üzdə qızarma
- Tər ifrazının artması
- Dəri testlərinə verilən cavablarda azalma
- Əzələlərdə zəiflik
- Steroidlərin istifadəsi nəticəsində əzələ xəstəlikləri (miopatiya)
- Əzələ kütləsində azalma
- Əzələlərin yırtılması, vətərlərin yırtılması
- Bədənin onurğa sümüklərində sınıqlar
- Uzun sümüklərdə sınıqlar
- Yuxarı və aşağı ətraf sümüklərinin uclarında hüceyrələrin ölümü
- İnfeksiyanın təhrif edilməsi
- Latent (gizli) infeksiyaların aktivləşməsi
- Opportunistik (fərsətçi) infeksiyalar
- Orqanizmdə natrium və suyun ləngiməsi (tutulması)
- Kaliumun orqanizmdən xaric edilməsi
- Orqanizmdə turşu-qələvi balansının pozulması
- Orqanizmdə qaraciyər fermentlərinin (alanin transaminazalar (ALT, SGPT), aspartat transaminazalar (AST, SGOT) və qələvi fosfataza) səviyyəsinin artması.

• Leykositoz.

Əgər bu içlik vərəqədə qeyd edilməyən hər hansı bir əlavə təsir meydana çıxarsa, bu barədə həkiminizə və ya əczaçıya məlumat verin.

Doza həddinin aşılması

Əgər GENKORT-dan istifadə etməli olduğunuzdan çox istifadə etmişinizsə, həkim və ya əczaçı ilə məsləhətləşin.

Lazım olduğundan artıq miqdarda GENKORT istifadə etmişinizsə, dərhal həkimlə və ya əczaçı ilə danışın.

Buraxılış forması

10 tablet, PVX/AL blisterdə. 6 blister (60 tablet), içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti

25°C-dən aşağı otaq temperaturunda, orijinal qablaşdırmasında və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Həddindən artıq istidən, işıqdan və nəmədən qoruyun. Dondurmayın.

Yararlılıq müddəti bitmiş və ya artıq istifadə edilməyən dərman preparatlarını çirkab sularının və məişət tullantılarının içərisinə atmayın. Onların hara atılmasını əczaçıdan soruşun. Bu tədbirlər ətraf mühitin qorunmasına xidmət edir.

Yararlılıq müddəti

Yararlılıq müddəti qablaşdırmanın üzərində göstərilmişdir.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ASO 2. Ve 3. OSB Alcı Mah. 2013. Cad. No:24 Sincan/ANKARA.

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok. No:3, Balgat Çankaya/ANKARA.

Tel: + 90 (312) 219 62 19.

Faks: + 90 (312) 219 60 10.